

圖 1.1 中西醫診斷治療比較圖




圖 2.1 中醫證型模式關係圖

表 4.3：中醫證候辨治軌範版之證型分佈表

	總人次	z1 風寒犯肺	z2 風熱襲肺	z3 寒痰阻肺	z4 痰熱壅肺	z5 寒飲	z6 肺氣虛	z7 肺陰虛	z8 肺陽虛	z9 肺氣衰竭
全部人次 (%)	122	0	1 (0.82)	0	0	1 (0.82)	0	0	0	0
住院人次	84	0	1 (1.20)	0	0	1 (1.20)	0	0	0	0
住院前 2 日	53	0	1 (1.90)	0	0	0	0	0	0	0
住院後 5 日	31	0	0	0	0	1 (3.20)	0	0	0	0
配對樣本/人數										
住院前 2 日/人數	31	0	1 (3.20)	0	0	0	0	0	0	0
住院後 5 日/人數	31	0	0	0	0	1 (3.20)	0	0	0	0
門診	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4.3：續

	總人次	z10 脾氣虛	z11 脾陽虛	z12 腎陰虛	z13 腎陽虛	z14 肝火	z15 血瘀	z16 痰濁	z17 陽虛水泛	z18 燥邪犯肺
全部人次 (%)	122	0	0	3 (2.5)	0	0	0	0	0	0
住院人次	84	0	0	3 (3.6)	0	0	0	0	0	0
住院前 2 日	53	0	0	3 (5.7)	0	0	0	0	0	0
住院後 5 日	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配對樣本/人數										
住院前 2 日/人數	31	0	0	1 (3.2)	0	0	0	0	0	0
住院後 5 日/人數	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
門診	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4.4：修正版之證型分佈表

	總人次	z1 風寒犯肺	z2 風熱襲肺	z3 寒痰阻肺	z4 痰熱壅肺	z5 寒飲	z6 肺氣虛	z7 肺陰虛	z8 肺陽虛	z9 肺氣衰竭
全部人次 (%)	122	2 (1.6)	15 (12.3)	14 (11.5)	43 (35.3)	14 (11.5)	40 (32.8)	6 (4.9)	0	0
住院人次	84	2 (2.4)	15 (17.9)	8 (9.5)	35 (41.7)	9 (10.7)	35 (41.7)	4 (4.8)	0	0
住院前 2 日	53	2 (3.8)	14 (26.4)	5 (9.4)	21 (39.6)	6 (11.3)	24 (45.3)	3 (5.7)	0	0
住院後 5 日	31	0	1 (3.2)	3 (5.7)	14 (45.2)	3 (9.7)	11 (35.5)	1 (3.2)	0	0
配對樣本/人數										
住院前 2 日/人數	31	0	11 (35.5)	0	17 (54.8)	1 (3.2)	16 (51.6)	1 (3.2)	0	0
住院後 5 日/人數	31	0	1 (3.2)	3 (9.7)	14 (45.2)	3 (9.7)	11 (35.5)	1 (3.2)	0	0
門診	38	0	0	6 (15.8)	8 (21.1)	5 (13.2)	5 (13.2)	2 (5.3)	0	0

表 4.4：續

	總人次	z10 脾氣虛	z11 脾陽虛	z12 腎陰虛	z13 腎陽虛	z14 肝火	z15 血瘀	z16 痰濁	z17 陽虛水泛	z18 燥邪犯肺
全部人次 (%)	122	59 (48.4)	10 (8.2)	74 (60.7)	0	60 (49.2)	106 (86.9)	59 (48.4)	0	7 (5.7)
住院人次	84	48 (57.1)	8 (9.5)	56 (66.7)	0	48 (57.1)	78 (92.9)	38 (45.2)	0	5 (6.0)
住院前 2 日	53	29 (54.7)	4 (7.5)	35 (66.0)	0	36 (67.9)	49 (92.5)	24 (45.3)	0	1 (1.9)
住院後 5 日	31	19 (61.3)	4(12.9)	21 (67.7)	0	12 (38.7)	29 (93.5)	14 (45.2)	0	4(12.9)
配對樣本/人數										
住院前 2 日/人數	31	19 (61.3)	4 (12.9)	17 (54.8)	0	23 (74.2)	28 (90.3)	12 (38.7)	0	1 (3.2)
住院後 5 日/人數	31	19 (61.3)	4 (12.9)	21 (67.7)	0	12 (38.7)	29 (93.5)	14 (45.2)	0	4(12.9)
門診	38	11 (29.0)	2 (5.3)	18 (47.4)	0	12 (31.6)	28 (73.7)	21 (55.3)	0	2 (5.3)

表 4.5：醫師判斷版之證型分佈表

	總人次	z1 風寒犯肺	z2 風熱襲肺	z3 寒痰阻肺	z4 痰熱壅肺	z5 寒飲	z6 肺氣虛	z7 肺陰虛	z8 肺陽虛	z9 肺氣衰竭
全部人次 (%)	122	13 (10.7)	5 (4.1)	16(13.1)	78 (64.0)	4 (3.3)	64 (52.5)	6 (4.9)	1 (0.8)	0
住院人次	84	13 (15.5)	5 (5.0)	7 (8.3)	55 (65.5)	2 (2.4)	44 (52.4)	3 (3.6)	0	0
住院前 2 日	53	9 (17.0)	5 (9.4)	2 (3.8)	32 (60.4)	2 (3.8)	30 (56.6)	2 (3.8)	0	0
住院後 5 日	31	4 (12.9)	0	5(16.1)	23 (74.2)	0	14 (45.2)	1 (3.2)	0	0
配對樣本/人數										
住院前 2 日/人數	31	5 (16.1)	4 (12.9)	0	19 (61.3)	0	17 (54.8)	1 (3.2)	0	0
住院後 5 日/人數	31	6 (19.4)	1 (3.2)	5(16.1)	21 (67.7)	0	15 (48.4)	1 (3.2)	0	0
門診	38	0	0	9(23.7)	23 (60.5)	2 (5.3)	20 (52.6)	3 (7.9)	1 (2.6)	0

表 4.5：續

	總人次	z10 脾氣虛	z11 脾陽虛	z12 腎陰虛	z13 腎陽虛	z14 肝火	z15 血瘀	z16 痰濁	z17 陽虛水泛	z18 燥邪犯肺
全部人次 (%)	122	63 (51.6)	2 (1.6)	93 (76.2)	77 (63.1)	75 (61.5)	74 (60.7)	11 (9.0)	0	1 (0.8)
住院人次	84	51 (60.7)	2 (2.9)	73 (86.9)	54 (64.3)	56 (66.7)	60 (71.4)	7 (8.3)	0	0
住院前 2 日	53	34 (64.2)	1 (1.9)	47 (88.7)	31 (58.5)	36 (67.9)	36 (67.9)	6 (11.3)	0	0
住院後 5 日	31	17 (54.8)	1 (1.9)	26 (83.9)	23 (74.2)	20 (64.5)	24 (77.4)	1 (3.2)	0	0
配對樣本/人數										
住院前 2 日/人數	31	22 (71.0)	0	27 (87.1)	18 (58.1)	21 (67.7)	20 (64.5)	3 (9.7)	0	1 (3.2)
住院後 5 日/人數	31	17 (54.8)	1 (3.2)	26 (83.9)	23 (74.2)	19 (61.3)	23 (74.2)	1 (3.2)	0	0
門診	38	12 (31.6)	0	20 (52.6)	23 (60.5)	19 (50.0)	14 (36.8)	4 (10.5)	0	1 (1.2)

表 4.6：醫師判斷與修正版之各類證型比較表

證型	z1		z2		z3		z4		z5		z6		z7		z8		z9	
	風寒犯肺		風熱襲肺		寒痰阻肺		痰熱壅肺		寒飲		肺氣虛		肺陰虛		肺陽虛		肺氣衰竭	
修正版判別	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有
醫師判別																		
有	2	11	5	0	7	9	32	46	2	2	30	34	0	6	0	1	0	0
沒有	0	109	10	107	7	99	11	33	12	106	10	48	6	110	0	121	0	122
sensitivity	100%		33.3%		50.0%		74.4%		14.3%		75.0%		0		NA		NA	
specificity	90.8%		100%		91.7%		41.8%		98.1%		56.1%		94.8%		99.2%		100%	
Kappa	0.245		0.467		0.392		0.137		0.18		0.291		NA		NA		NA	
McNemar test, p 值	<0.0001		0.002		0.804		<0.0001		0.013		<0.0001		1.000		NA		NA	

表 4.6：續

證型	z10		z11		z12		z13		z14		z15		z16		z17		z18	
	脾氣虛		脾陽虛		腎陰虛		腎陽虛		肝火		血瘀		痰濁		陽虛水泛		燥邪犯肺	
修正版判別	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有
醫師判別																		
有	50	13	0	2	68	25	0	77	55	20	70	4	10	1	0	0	0	1
沒有	9	50	10	110	6	23	0	45	5	42	36	12	49	62	0	122	7	114
sensitivity	84.7%		0		91.9%		NA		91.7%		66.0%		16.9%		NA		0	
specificity	79.4%		98.2%		47.9%		36.9%		67.7%		75.0%		98.4%		100%		99.1%	
Kappa	0.640		0.028		0.428		NA		0.392		0.222		0.158		NA		NA	
McNemar test, p 值	0.523		0.039		0.001		NA		0.004		<0.0001		<0.0001		NA		0.070	

【註】 NA：not available

表 4.7：住院二日內與住院五日後之各類證型比較表

證型	z1		z2		z3		z4		z5		z6		z7		z8		z9	
	風寒犯肺		風熱襲肺		寒痰阻肺		痰熱壅肺		寒飲		肺氣虛		肺陰虛		肺陽虛		肺氣衰竭	
	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有
住院五日後																		
住院二日內																		
有	0	0	1	10	0	0	12	5	1	0	11	5	0	1	0	0	0	0
沒有	0	31	0	20	3	28	2	12	2	28	0	15	1	29	0	31	0	31
Kappa	NA		0.114		NA		0.553		0.475		0.700		NA		NA		NA	
McNemar test, p 值	NA		0.002		NA		0.453		0.500		0.063		1.000		NA		NA	

表 4.7：續

證型	z10		z11		z12		z13		z14		z15		z16		z17		z18	
	脾氣虛		脾陽虛		腎陰虛		腎陽虛		肝火		血瘀		痰濁		陽虛水泛		燥邪犯肺	
	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有	有	沒有
住院五日後																		
住院二日內																		
有	17	2	2	2	16	1	0	0	12	11	27	1	7	5	0	0	0	1
沒有	2	10	2	25	5	9	0	31	0	8	2	1	7	12	0	31	4	26
Kappa	0.728		0.426		0.600		NA		0.36		0.350		0.209		NA		NA	
McNemar test, p 值	1.000		1.000		0.219		NA		0.001		1.000		0.774		NA		0.375	

【註】 NA：not available