秤重，上麻醉（乙醚）
埋管手術（Lt. femoral a.與 Rt. carotid a.）
老鼠休息 3 小時

▬▬→ 插上 monitor 導管探針

▬▬→ 開始紀錄

30 分鐘(為了獲取穩態基線)
(第一次放血前 1 分鐘紀錄為 time 1)

▬▬→ 第一次插上放血針筒
(在 3-5 分鐘之內以手抽 40％血)

▬▬→ 第一次結束放血
(第一次放血後 0-1 分鐘紀錄為 time 2)
10 分鐘 (第一次放血後 5-6 分鐘紀錄為 time 3)
(第二次放血前 1 分鐘紀錄為 time 4)

▬▬→ 第二次插上放血針筒
(在 3-5 分鐘之內以手抽 20％血)

▬▬→ 第二次結束放血
(第二次放血後 0-1 分鐘紀錄為 time 5)
(第二次放血後 5-6 分鐘紀錄為 time 6)
21 分鐘 (第二次放血後 10-11 分鐘紀錄為 time 7)
(第二次放血後 15-16 分鐘紀錄為 time 8)
(第二次放血後 20-21 分鐘紀錄為 time 9)

▬▬→ 第二次放血結束後 21 分鐘結束紀錄

圖一、放血實驗步驟

1. ▬▬→ 為按下紀錄處。
2. 抽血體積之計算取至小數點第一位。
3. 紀錄時間內如死亡則紀錄為死亡，紀錄時間內如未死亡則紀錄為存活。