

Figure 1. 金線連水抽出液和指標成分 Gastrodin、HBA 和 uracil 之高效液相層析 (HPLC) 圖。

(1) 定量金線連指標成分之標準品混合液

(2) 金線連水抽出液




Figure 2. 金線連指標成分 Gastrodin、HBA 和 uracil 在血清檢品中之
 高效液相層析 (HPLC) 圖

(1) 空白血清

(2) 在空白血清中之 gallic acid 及三指標成分




Figure 3. 金線連指標成分 Gastrodin、HBA 和 uracil 在血清檢品中之
 高效液相層析 (HPLC) 圖

- (1) 大鼠在靜脈注射 Gastrodin 後之血清檢品
- (2) 大鼠在靜脈注射 HBA 後之血清檢品
- (3) 大鼠在靜脈注射 uracil 後之血清檢品








Figure 4. (1) Gastrodin 標準品溶液定量標準曲線
(2) HBA 標準品溶液定量標準曲線
(3) uracil 標準品溶液定量標準曲線

(1)



(2)



(3)




Figure 5. (1) Gastrodin 在大鼠血清中之定量標準曲線

(4) HBA 在大鼠血清中之定量標準曲線

(5) uracil 在大鼠血清中之定量標準曲線




Figure 6. 六隻大鼠靜脈注射 Gastrodin 標準品後之血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 7. 六隻大鼠靜脈注射 HBA 標準品後之血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 8. 六隻大鼠靜脈注射 uracil 標準品後之血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 9. 六隻大鼠靜脈注射 Gastrodin 標準品後之平均血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 10. 六隻大鼠靜脈注射 HBA 標準品後之平均血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 11. 六隻大鼠靜脈注射 uracil 標準品後之平均血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 12. 六隻大鼠口服 Gastrodin 標準品 (200 mg/kg) 後之血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 13. 六隻大鼠口服 Gastrodin 標準品 (400 mg/kg) 後之血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 14. 六隻大鼠口服 HBA 標準品(200 mg/kg)後之血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 15. 六隻大鼠口服 HBA 標準品(400 mg/kg)後之血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 16. 六隻大鼠口服 uracil 標準品(100 mg/kg)後之血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 17. 六隻大鼠口服 uracil 標準品(200 mg/kg)後之血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 18. 六隻大鼠口服 Gastrodin 標準品 (200 mg/kg) 後之平均血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 19. 六隻大鼠口服 Gastrodin 標準品 (400 mg/kg) 後之平均血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 20. 六隻大鼠口服 HBA 標準品 (200 mg/kg) 後之平均血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 21. 六隻大鼠口服 HBA 標準品 (400 mg/kg) 後之平均血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 22. 六隻大鼠口服 uracil 標準品 (100 mg/kg) 後之平均血清中濃度—時間曲線圖。




Figure 23. 六隻大鼠口服 uracil 標準品 (200 mg/kg) 後之平均血清中濃度—時間曲線圖。