

附錄

中國醫藥大學附設醫院作業標準書

標準類別	<input checked="" type="checkbox"/> 作業流程 照護標準 技術標準	標準名稱	針灸病人取針流程	SOP 編號：SOP-950-00003																														
				頁碼/頁數：1/2																														
				主辦部門：針灸科																														
				制定日期：094/06/07																														
				修訂年限：每年一次																														
				最近修訂日期：--- /--/--																														
				已修訂次數：0 次																														
<p>一、目的： 使醫護人員取針時，有完整的安全適切規則可循。</p> <p>二、適用範圍： 中醫部接受針刺治療患者取針時使用。</p> <p>三、說明：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">作業項目</th> <th style="width: 50%;">流程說明/注意事項(含異常處理)</th> <th style="width: 20%;">備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 確認取針。</td> <td>鬧鈴響起時，取針人員確認需取針之床位，並關閉鬧鈴。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 取乾棉球。</td> <td>以無菌技術，用鑷子夾取乾棉球 2-3 顆，置於非慣用手。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 通知患者。</td> <td>至需取針患者身邊告知將進行取針。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 準備取針。</td> <td>將棄針筒移到患者針刺部份附近平坦區域，勿使之傾倒。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. 確認取針數目。</td> <td>確認床頭牆上計針板上所記載之施針數目。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 進行取針。</td> <td>以慣用手輕拍針刺部份附近皮膚，再以非慣用手持乾棉球貼近針體。以慣用手，依病患呼吸節奏，於吸氣時出針，分 2-3 次出針，待至皮下時稍停，再將針完全取出。依數將針完全取出，並確認針數與施針數目相同。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 意外事件處理。</td> <td>1.如有出血，以乾棉球擦拭出血，必要時，壓迫止血。 2.如發生暈針情形，則適用針灸病人暈針時處理流程 SOP-950-00002。 3.如取針人員發生針扎事件，則適用護理部品管委員會所制定之針扎意外處理流程 SOP-N00-BP031。</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">註 1 註 2</td> </tr> <tr> <td>8. 棄針。</td> <td>將取出之針置入棄針筒，乾棉球置入換藥碗。並將棄針筒歸於床頭櫃。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 完成。</td> <td>告知患者取針完成。請患者緩慢起身，確認無遺針、出血或暈針，則可離開診間。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>四、備註說明：</p> <p>(一)、註 1：針灸病人暈針時處理流程 SOP-950-00002 如附件一。</p> <p>(二)、註 2：護理部品管委員會之針扎意外處理流程 SOP-N00-BP031 如附件二。</p>					作業項目	流程說明/注意事項(含異常處理)	備註	1. 確認取針。	鬧鈴響起時，取針人員確認需取針之床位，並關閉鬧鈴。		2. 取乾棉球。	以無菌技術，用鑷子夾取乾棉球 2-3 顆，置於非慣用手。		3. 通知患者。	至需取針患者身邊告知將進行取針。		4. 準備取針。	將棄針筒移到患者針刺部份附近平坦區域，勿使之傾倒。		5. 確認取針數目。	確認床頭牆上計針板上所記載之施針數目。		6. 進行取針。	以慣用手輕拍針刺部份附近皮膚，再以非慣用手持乾棉球貼近針體。以慣用手，依病患呼吸節奏，於吸氣時出針，分 2-3 次出針，待至皮下時稍停，再將針完全取出。依數將針完全取出，並確認針數與施針數目相同。		7. 意外事件處理。	1.如有出血，以乾棉球擦拭出血，必要時，壓迫止血。 2.如發生暈針情形，則適用針灸病人暈針時處理流程 SOP-950-00002。 3.如取針人員發生針扎事件，則適用護理部品管委員會所制定之針扎意外處理流程 SOP-N00-BP031。	註 1 註 2	8. 棄針。	將取出之針置入棄針筒，乾棉球置入換藥碗。並將棄針筒歸於床頭櫃。		9. 完成。	告知患者取針完成。請患者緩慢起身，確認無遺針、出血或暈針，則可離開診間。	
作業項目	流程說明/注意事項(含異常處理)	備註																																
1. 確認取針。	鬧鈴響起時，取針人員確認需取針之床位，並關閉鬧鈴。																																	
2. 取乾棉球。	以無菌技術，用鑷子夾取乾棉球 2-3 顆，置於非慣用手。																																	
3. 通知患者。	至需取針患者身邊告知將進行取針。																																	
4. 準備取針。	將棄針筒移到患者針刺部份附近平坦區域，勿使之傾倒。																																	
5. 確認取針數目。	確認床頭牆上計針板上所記載之施針數目。																																	
6. 進行取針。	以慣用手輕拍針刺部份附近皮膚，再以非慣用手持乾棉球貼近針體。以慣用手，依病患呼吸節奏，於吸氣時出針，分 2-3 次出針，待至皮下時稍停，再將針完全取出。依數將針完全取出，並確認針數與施針數目相同。																																	
7. 意外事件處理。	1.如有出血，以乾棉球擦拭出血，必要時，壓迫止血。 2.如發生暈針情形，則適用針灸病人暈針時處理流程 SOP-950-00002。 3.如取針人員發生針扎事件，則適用護理部品管委員會所制定之針扎意外處理流程 SOP-N00-BP031。	註 1 註 2																																
8. 棄針。	將取出之針置入棄針筒，乾棉球置入換藥碗。並將棄針筒歸於床頭櫃。																																	
9. 完成。	告知患者取針完成。請患者緩慢起身，確認無遺針、出血或暈針，則可離開診間。																																	