

**Erlotinib (Tarceva®)**  
**引起皮膚癢疹之藥物不良反應案例探討**

中國醫藥學院附設醫院 皮膚科 王博醫師主講  
中國醫藥學院附設醫院 皮膚科 王博醫師主講  
中國醫藥學院附設醫院 皮膚科 王博醫師主講

**醫 案 背 景 知 識**

皮膚科中常見藥物Erlotinib (Tarceva®) 引起皮膚癢疹不良反應。Erlotinib (Tarceva®) 為一種酪氨酸激酶抑制劑，用於治療非小細胞肺癌。其副作用包括皮膚癢疹、腹瀉、疲勞等。皮膚癢疹表現為紅腫、瘙癢、丘疹等。嚴重者可導致水腫、潰瘍。患者應密切觀察皮膚變化，及時就醫。治療包括口服抗癢藥、外用糖皮質激素等。嚴重者需住院治療。

**病 史 概 述**

患者，男，65歲，因「肺癌」接受Erlotinib治療。服用藥物後出現全身性皮膚瘙癢、紅腫、丘疹等症狀。症狀在服用藥物後逐漸加重，伴隨明顯不適。患者曾服用抗癢藥物，但效果不佳。最終經皮膚科診治，診斷為藥物性皮膚癢疹。經調整藥物及治療後，症狀逐漸緩解。

**診 斷 與 治 療**

診斷：藥物性皮膚癢疹。治療：口服抗癢藥物（如氯雷他定、西替利嗪等），外用糖皮質激素（如糠酸莫米松乳膏等）。嚴重者可考慮口服糖皮質激素（如泼尼松等）。患者應避免搔抓，保持皮膚清潔，並注意營養均衡。

**醫 學 推 薦**

1. 密切觀察皮膚變化，及時就醫。  
2. 避免搔抓，保持皮膚清潔。  
3. 注意營養均衡，增強免疫力。  
4. 嚴重者應住院治療。

**結 語**

Erlotinib (Tarceva®) 引起皮膚癢疹不良反應，應引起臨床醫生及患者重視。及時診斷與治療可緩解症狀，提高患者生活質量。

中國醫藥學院附設醫院  
China Medical University Hospital