

半邊蓮

文·圖／藥劑部
藥師
張坤隆

夏天到野外散心，應慎防蛇吻，趕在這個容易有蛇出沒的季節，就為你介紹可治毒蛇咬傷的半邊蓮吧！

半邊蓮在夏秋兩季開花，花單生，花梗直立，花瓣5片。花冠外觀和蓮花有點相似，但只有蓮花的一半，就像被切開了一樣，故稱「半邊蓮」。


在民間有此一說，相傳觀音經過一個村莊，聽見淒涼的小孩哭聲。觀音俯視一間破損茅屋，只見幾個小孩圍在母親身旁哭著，原來這名婦人被毒蛇咬傷，昏迷不醒。觀音從坐盤摘下一朵蓮花，將半朵蓮花塗抹在婦人的傷口處，沒多久，傷口流出許多毒汁，婦人便醒來了。觀音臨走時，留下另半朵蓮花，一陣風雨過後，半朵蓮花在田野間茂盛生長，「半邊蓮」的名號不脛而走。雖然這是民間流傳的故事，但半邊蓮確實可以治療毒蛇咬傷，具有利尿、消腫、解毒的功效。

半邊蓮為桔梗科山梗菜屬植物半邊蓮 *Lobelia chinensis* LOUR. 的全草，形態特徵為多年生矮小草本，全株光滑無毛。莖節處有多數鬚根。葉互生，無葉柄，葉子披針形，全緣。夏季由葉腋開單生淡紫色小花；花冠基部合成管狀，上部向一邊5裂展開，中央3裂片較淺，兩側裂片深裂至基部。喜潮濕環境，多生長於田埂草地、溝邊、溪邊濕地。

半邊蓮的性味歸經，辛、微苦，歸心、肺、小腸經。功能為清熱解毒、利尿消腫。臨床主治用於毒蛇咬傷、肝硬化腹水、腎炎水腫、扁桃腺炎；外用治跌打損傷、癰癤疔瘡。全草含有多種生物鹼，主要為山梗菜鹼、山梗菜醇鹼、山梗菜酮鹼、異山梗菜酮鹼、皂苷、黃酮類等。半邊蓮的動物試驗證明它能利尿，而且對金黃色葡萄球菌、傷寒桿菌、大腸桿菌、綠膿桿菌都有抑制作用。

花冠向一邊5裂展開，中央3裂片較淺，兩側裂片深裂。





水生植物區常見有關半邊蓮的介紹



中央3裂片較淺，兩側裂片深裂。



葉互生，無葉柄，葉子披針形，全緣。

臨床應用

- 1.用於毒蛇咬傷、癰瘡腫毒，可內服或外用。治毒蛇咬傷，可單味煎服，或鮮品搗汁加酒，並用本品搗爛，或配半夏同搗爛，和雞蛋清調敷傷口周圍。治癰腫疔毒，可配紫花地丁、金銀花、野菊花等煎服。
- 2.用於濕疹、足癬、跌打損傷，可將半邊蓮煎濃液濕敷患處。
- 3.用於濕熱黃疸、腹水腫脹。治腹水腫脹，單用或配金錢草、馬鞭草、枳實等同煎服。治黃疸，可配山梔子、茵陳、大黃等藥同煎服。如今也常用於治療各種癌症，可配半枝蓮、白花蛇舌草等同用，以增強抗癌作用。

下次經過田野間，請放慢腳步，你或許會發現花冠被切成一半，外形和蓮花有點相似，奇特又美麗的「半邊蓮」呢！但是，切記任何病症均應先由醫師辨症論治後開藥治療，才是最安全的作法。🌿

參考資料

- 1.全國中草藥匯編上冊
- 2.臺灣藥用植物資源名錄
- 3.醫用中藥飲片學