

## 藥材辨識

從「莖有細孔，兩頭皆通」剖析「通草與木通」下

文/中藥局 謝雲忠 藥師

考之歷代本草圖文，校之現代植物圖鑑，神農本草經之藥名：通草，即現代植物學木通科之木通。陳藏器本草拾遺所植通草（通脫木）其藥用部位為花，其用法主治亦皆外用，其所徵引葉似蓖麻，與本經繞莖藤生性狀不符，不足考慮。至此吾人確知宋以前本草所言通草，實即為木通科木通，宋以前諸方無庸置疑，筆下通草，取用木通，放諸四海皆準。藥材名木通則起自五代南唐陳士良食性本草。

近世何以木通之用反生疑惑，其理實藥典之過：

### 1.藥典收載

	1963	1777	1985	1990	1995	2000
木通	+	-	-	-	-	-
川木通	+	+	+	+	+	+
關木通	+	+	+	+	+	+
通草	+	+	+	+	+	+

正品通草不再收載，其用煙飛灰滅，不足為奇！

### 2.藥典所錄主治功能

**川木通** 清熱利尿、通經下乳。用于水腫、淋病、小便不通、關節痺痛、經閉乳少。

**關木通** 清心火，利小便，通經下乳。用于口舌生瘡，心煩尿赤，水腫，熱淋澀痛，白帶，經閉乳

少，濕熱痺痛。

**通草** 清熱利尿，通氣下乳。用于濕熱尿赤，淋病澀通，水腫尿少，乳汁不下。

按：上列不同種屬之藥材，其功用只有排列組合之別，道地藥材何義？

### 3. 中華民國中藥材典範

第一輯第一冊（正文）

第二冊（正文）

第三冊（附錄）

第四冊（附錄）

木通 *Akebiae Caulis*

來源：本品為木通科植物白木通

白木通（*Akebia trifoliata* (THUNB.)

KOIDZ.或馬兜鈴科植物

木通馬兜鈴（*Aristolochia manshuriensis*

KOMA.）及近緣植物之乾燥莖

通草 *Tetrapanacis Medulla*

來源：本品為五加科植物

通脫木（*Tetrapanax papyriferus*

(K.KOCH)之乾燥莖髓。謝按：一種生藥名

會有二科屬藥材皆合定義，不也怪哉！

### 三、處方藥味選用

處方一用途、主治考驗

備急千金要方—唐·孫思邈（AD652）

下乳第九方二十一首

治婦人乳無汁 鍾乳湯方

石鍾乳、白石脂各六銖

通草十二銖 桔梗半兩切

消石六銖（一方用滑石）

註：下乳方凡二十一首，其中藥味組成含通草者共十方。

七竅病上

治鼻塞 窒香膏方

白芷 芎藭 通草各十八銖

當歸 細辛 莽草 辛夷各

三十銖

## 處方選用

### 龍膽瀉肝湯

【方源】《醫方集解》引《局方》。

【組成】木通 龍膽草（酒炒） 黃芩（炒） 梔子（酒炒） 澤瀉 車前子 當歸（酒洗） 生地黃（酒炒） 柴胡 甘草（生用）

### 導赤散 17

【組成】木通 生地 甘草梢 木通丸 12 木通湯 42 木通飲 10 木通散 66 木通粥 1 木通膏 5 撲朔迷離，通與不通如是而已。阿拉伯數為歷代以木通為方名彙總數。

## 四、討論

- 1.藥材名通草始著神農草經，一脈傳承至新修本草，性味、功用、主治確著，生長環境、採收時節、藥用部位亦頗明晰。
- 2.產地直指近道，按唐朝行政區：京兆府—西京（西安）京畿道—長安、咸陽。還有劍南道、黔中道…近道即京城近郊，與圖鑑所記分布無不殊。
- 3.新修本草為第一次全國生藥大普察，衍生之彩色圖譜，直截「屬」之特徵，今以植物「屬」之識別法，循軌謀合，法之圓也。
- 4.通草（木通）闖入通草（通脫木）始本草拾遺，但其藥用部位為「花上粉」，主治為外用，

用法「內瘡中」，斑斑可考，「髓」為女工飾物，字正辭嚴，醫藥人 不求甚解，下筆便誤。

5.毛茛科小木通，川木通除非藥理、成分、實驗證明，若謂能代木通，失之遠矣，充其量不含馬兜鈴酸如是而已。

6.植物名誤承藥材名，積非成是久矣，無本草，方藥即無繩墨。

備註：

圖 1：中國高等植物圖鑑，科學出版社，第一冊，p748。

圖 2：中國高等植物圖鑑，科學出版社，第一冊，p749。

圖 3：中國高等植物圖鑑，科學出版社，第一冊，p544。

圖 4：中國高等植物圖鑑，科學出版社，第二冊，p1027。

圖 5：中國高等植物圖鑑，科學出版社，第二冊，p606。

圖 6：本草綱目藥物彩色圖鑑，人民衛生出版社，p186。