

# 腎臟炎之藥物治療及其調養法

\* 作者本學院調劑學教授

呂世行

一、腎臟的功能：腎臟為可溶於水而不揮發之新陳代謝產物的主要排泄器官。其基本構造稱腎單位（Renal unit），由一腎小球（Renal glomerulus）及一腎小管（Renal tubule）所成。每一腎臟約有一百萬個腎單位，血液流經腎小球內之毛細管時，因管內外之壓力不同，一部份液體由擴散作用透過腎小球而流入腎小管，在腎小管內，液體中之各種成份，受管壁作選擇性或程度不同之重吸收作用，未被重吸收之殘存液，流經收集管而成尿液。

二、腎臟炎的症狀：腎臟發炎時，由於腎單位的排泄及重吸收作用反常，以致對體內食鹽未能予以適當之排泄，乃引起臉、腿部甚至全身之水腫（edema）現象，皮膚呈黃白色，暗發亮光，缺乏固有之彈性，以手按之，陷深凹而遲遲復原。臉部水腫特於清晨在眼臉部最為顯著。尿中檢出多量蛋白，血球及膜球等，腰部常感酸痛。

三、腎臟炎的原因：本文所稱腎臟炎是指等小球、小管性腎臟炎（glomerulo-tubular Nephritis）其致病之因，根據專家的意見，此症常由於上呼吸道發生炎症而引起。一由於過敏性反應而引起，一由於細菌感染而引起。根據專家的經驗及內科學上之記載，腎臟炎病患指人生終站是一條粗線條，指南東後的指標上顯示一大問號。

四、腎臟炎的治療及調養：綜合專家的意見和作者親身體驗而對腎臟炎的治療及調養，獲致下列幾點結論：

(1) 住有細菌感染 (Infection)期間，應接受醫師抗生素治療。並用維生素乙劑 (維生素B) 及利尿劑補助治療。所用之抗生素仍以 Penicillin 及 Streptomycin 之合併藥劑 Combiotic 其效用較佳 (必先行過敏性試驗)，作者患腎臟炎時醫師會賞用此藥劑。其他藥劑如 1. Tetracycline 2. Chlorotetracycline 3. Oxytetracycline 4. Declomycin (Demethylchlortetracycline) 5. Kanamycin 等五種抗生素對腎臟有害，不宜使用，前四種對腎功能不全之孕婦，用作靜脈注射，每日兩克之劑量，可能致人於死。

6. Novobiocin (Cathomycin, Albamycin) 對肝有害，可能導致肝壞死 (Hepatic necrosis) 不到必要時不宜使用。

(2) 慢性療養期間，可利用維生素乙劑 (或乙複合劑)，丙酮，甲劑，丁劑等以促進健康。

(3) 療養重於治療：

1. 急性治療期間，每日吃食鹽不可超過三十公分。營養專家的意見，生食蛋類於腎臟有害。

2. 慢性療養期間，每日吃食鹽不可超過二公分 (2 gms)，蛋白質以維持五十公分以下為宜。長期淡食，要有堅強的毅力和忍耐性，嚴禁飲酒，並禁吃辣椒等刺激性食品。水腫症狀，可注射維生素乙劑 (或乙複合劑) 及利尿劑。多吃西瓜為優良之利尿劑。用西瓜汁濃縮液其利尿效果尤佳。長期維持低鹽食物，對消失水腫，大有裨益。

療養期間，臥床休養，每日夜以維持14~15小時為宜，保持適度，愉快情緒和恢復健康的堅強信心，該是屬於首要的。

每日可常漫步於空氣新鮮之處，可擔任輕度工作，但絕不可作劇烈運動或過分操勞工作。必要時可經常保持身體溫暖，居室被褥及衣服之清潔乾燥，被褥可常用日曬，不可受潮濕寒涼侵擾。必要時可用熱水袋，以保持腹腰部溫暖舒適。消除心悸，亦為身體康復之重要因素。健後仍應注意適度之保養，以防復發，尤應提高警覺。

## 蘭花的醫藥效果

### 蘭為王者香

蘭花乃指蘭科植物，可分為五百餘屬，一萬七千種，為觀花植物中僅次於菊科及豆科之大群，產地遍及全世界，以熱帶最為繁茂，寒帶則甚罕見，兩極及沙漠地區則找不到牠們的芳蹤。

蘭科植物之分佈有三大中心地，其中以印度，馬來最為豐富，單是馬來亞就有五千種之多；其次為中南美；非洲熱帶地方則較少。日本約有240種。

我國究有蘭花若干種，尚無文獻可稽，正宗嚴敬 (1944) 於「海南島植物誌」指出：海南島產者約31屬，51種。謝阿才 (1955) 於「臺灣之蘭科植物細目」一文中指出：臺灣固有者計94屬，366種，栽培者為48屬，358種。

國人對蘭花自古極為喜愛，常可見于墨客吟詠繪畫的筆卷之中，孔子（公元前551~479）的猗蘭操，即譽之為「王者香」，餘如左傳，越書、楚詞、蜀記、晉書等，對於蘭花均有記載，降至宋代 (960~1279)，蘭書、群芳譜，黃山谷蘭說等問世，養蘭之風已普及全國，尤以江南各省為最。臺灣養蘭之風極盛，有蘭藝月刊，嘉義有愛蘭會，每年均有蘭花展覽會，俾使于互相觀摩欣賞。蘭花專家胡錦先生，會有專著多種問世，近 (1970) 有「Formosan Orchid (天然色臺灣之蘭花)」再版問世，介紹臺灣野生之蘭花45屬，100種，甚受學者所重視；林業專家董新堂教授會著，有「養蘭學」，該書分蘭花之栽培理論，繁殖育種法以及各論三編，均對本省養蘭事業之貢獻甚大。

蘭花因其姿態秀而雅，色澤香而美，屬海出塵，高潔無儔，前賢喻為「賢友」、「德人」、「君子」、「良伴」諸雅號，可見國人對其敬重之一斑。

蘭花除為馳名全球之花卉外，尚可入藥，我國最古之藥文獻、「神農本草經」（后漢末年），即載有石斛，天麻，白及三味。作者於「藥用植物學」(1969) 介紹國產藥用植物39種。茲將全世界可供藥用者122種，簡介以供同好。

### 蘭花入藥百餘種

#### 1. 香風蘭 (*Angraecum fragrans*)

作茶飲，助消化。

金蓮線治肺病

#### 2. 金線蓮 (*Anoectochilus formosanus* Hay.)

臺灣。春夏開粉紅色花。為民間貴重藥材之一，全年採全草，鮮用或晒乾，稱金線蓮。治火退火，涼血固肺，祛痰解鬱，滋養強壯。主治肺病、高血壓、蛇傷、腎虧、小兒發育不良。用量4~40公克。(圖1)

#### 3. 冬無距蘭 (*Aplectrum hyemale*)

英名 Putty Root, Adam-and-eve。花淡綠褐色。接合劑。

#### 4. 南亞裸蘭 (*Apóstasia nuda* R.Br.)

印度至爪哇。一名 Adactylus nudus Rolfe。Alvins 氏謂：根煮后，敷胃部以治腹瀉。果煎汁治眼疾。

白及治打傷吐血。

\* 臺中市英才路2號，中國醫藥學院中國藥材研究中心藥用植物學研究報告

\*\* 甘樟松，本學院藥用植物學教授

5. 臺灣白及 (*Bletilla formosana* (Hay.) Schltr.)  
臺灣全省、綠島、蘭嶼。異名爲 *Blebra formosana* Hay.。夏季開白色或淡紫色花。鱗莖用爲粉劑，亦可入藥。

6. 白及 (*Bletilla striata* (Thunb.) Reichb.f.)  
中國、日本。夏季開紫紅色或白色。本草綱目卷12：塊莖含粘液質、精油及纖粉。圖2)

7. 輪葉飛燕蘭 (*Bulbophyllum vaginatum* Reichb.f.)  
馬來、印尼。Alvins氏謂：可治耳痛，將熟果炒后，將熟汁滴耳內。

8. 白鶴蘭 (*Calanthe furcata* Batem.)  
臺灣中北部；印度、澳洲。夏季開白色花。K.Heyne氏(1927)謂：在蘇門答臘，用花搗敷腫毒，有止痛之功。Rumpf氏謂：在摩奴加，取根與鴉鈔及其他芳香物質在口中咀嚼，可治久懶瀉。本屬植物含藍靛 (Indigo)。

9. 棒格三星蘭 (*Catasetum bingerothii* N.E.Br.)  
厄瓜多爾。壓用。G.Klein氏(1933)于「植物分析手冊」謂：含生物鹼。

10. 無色三星蘭 (*Catasetum discolor* Lindl.)  
同前種。

11. 虎克三星蘭 (*Catasetum hookeri* Lindl.)  
同前種。

12. 大果三星蘭 (*Catasetum macrocarpum* Rich.)  
尼亞那。夏季開綠黃花，淡紅褐色。同前種。

13. 板狀三星蘭 (*Catasetum latilare* Lindl.)  
同前種。

14. 哥倫比亞布袋蘭 (*Cattleya trianae* Lindl. et Reichb.f.)  
哥倫比亞。開玫瑰色花，花莢拌涼菜食。

15. 有苞七西施蘭 (*Chysis bractescens* Lindl.)  
Klein氏謂：葉含生物鹼。春季開黃白花5~9朵。

16. 蕊三七 (*Coelogysson viride* (L.) Hartm. var. *bracteatum* (Willd.) Richter)  
中國、韓國、日本、西伯利亞、北美。夏季開褐綠色花。(浙江)根稱蔓三七、佛手蔓。止血。大燭虎男(1930)謂：根含甘露聚糖 (mannan)。圖3)

17. 珊瑚根蘭 (*Corallorrhiza odontorhiza* Nutt.)  
美國。英名Crawley, Coral Root, Dragons' Claw, Chiken Toe。開褐色或淡紫色花。根部爲壯陽、鎮靜、解熱藥，主治各種熱病。水浸出物15~30滴。

18. 裸蕊葉鐵房蘭 (*Corynorkis veratrifolia* (Bl.) Reichb.f.)  
L.J. Webb氏(1952)于「澳洲植物化學之檢查」第2部指出：葉含生物鹼。

19. 采配蘭 (*Cremnastria appendiculata* Mak.)  
臺灣、日本至馬來。異名 *C. variabilis* (B.I.) Nakai。初夏開淡黃花。根莖含多量粘液質名甘露聚糖 (mannan)。(圖4)

20. 有溝蕙蘭 (*Cymbidium canaliculatum* R. Br.)  
L.J. Webb氏(1949)于「澳洲植物化學之檢查」第1部指出：全草含生物鹼。

21. 建蘭 (*Cymbidium ensifolium* (L.) Sw.)  
中國。夏季開黃綠花約12朵，有芳香。根莖用爲生津。(圖5)

22. 馬來蕙蘭 (*Cymbidium formosanum* Lindl.)  
中南半島、印尼。根爲象薑。

23. 圭萊蘭 (*Cymbidium formosanum* Hay.)  
臺灣。一名臺灣春蘭。早春開乳白色或綠色花，有芳香。作者調查：全年採全草晒乾，稱草蘭，味微甘平。潤肺入脾，寧神固氣利水。用量2~10公克。

24. 竹葉蘭 (*Cymbidium lancifolium* Hook.)  
臺灣、日本、琉球。夏季開白色或桃紅色花。作者調查：全草切碎，晒乾稱樹蘭。寧神固氣利水。

25. 马蘭 (*Cymbidium rubrigemmum* Hay.)  
臺灣。一名素蘭。四季開花淡黃色或乳白色，有芳香。作者調查：全草爲晒乾稱樹蘭，味微甘，性平，潤肺入脾，寧神固氣利水。

26. 無盤拖鞋蘭 (*Cypripedium acaule*)  
拖鞋蘭鎮庭蘭。

27. 鐘座拖鞋蘭 (*Cypripedium bulbosum* Miller)  
鐘座蘭。美國。夏季開淡棕色花。

28. 拖鞋蘭 (*Cypripedium formosanum* Hay.)  
臺灣。全草治吐血。可能爲誤用。(圖7)

29. 圓拖鞋蘭 (*Cypripedium guttatum* Sw.)  
亞洲北部。花紫白色。根治神經疾患。

30. 小花拖鞋蘭 (*Cypripedium parviflorum* Salisb.)  
北美、加拿大。5~6月開黃花。根及根莖爲鎮痙藥。

31. 毛拖鞋蘭 (*Cypripedium pubescens* Mill.d.)  
北美、歐洲。一名 *Cypripedium hirsutum* Mill. 英名 Lady's slipper, American Valentine, Ner-veroot, Noah's Ark, Yellow Lady's Slipper。根及根莖稱 Cypripedium，具弱刺激作用，爲鎮痙，強壯劑，主治神經疾患、頭痛、癲病。

石斛送陰益胃  
32. 鈎狀石斛 (*Dendrobium aduncum* Wall.)  
福建、廣東、喜馬拉雅。秋季取莖，去葉，鮮用，稱鮮石斛。蒼石斛(本經)，滋陰益胃，生津液。用量8~16公克。(圖8)

33. 海南石斛 (*Dendrobium aggregatum* Roxb.)  
海南、海南島。(廣西)莖爲石斛原料之一，稱金黃澤，效與石斛同。

34. 艾氏石斛 (*Dendrobium ainsworthii* T.Moore)  
Keein氏謂：含生物鹼。

35. 小美石斛 (*Dendrobium bellatum* Rolfe)  
雲南。一名黑節草。取長約4公分的鮮石斛，加工後稱風斗耳環石斛，爲石斛原料之一，效用亦同。

36. 綠石斛 (*Dendrobium chlorops* Lindl.)  
印度。全草治各種胃痛，能刺激膽汁，並爲腸之緩瀉劑。

37. 金蘭 (*Dendrobium chrysanthum* Wall.)  
華南、緬甸。秋季開花。(廣西)莖用清石灰泡一日，晒乾，稱馬鞭石斛、馬鞭草。爲石斛原料之一(圖9)

38. 銅皮石斛 (*Dendrobium cristatum* K.Kimura et Migo)

浙江。莖鮮用，稱鮮石斛。加工后，稱銅皮石斛，黃草、黃草石斛，圓莖乾石斛。爲石斛原料之一。

39. 大葉石斛 (*Dendrobium crumenatum* Sw.)

華南、臺灣、中南半島。英名 Pigeon Orchid, White Dove Pigeon Flower。夏季開花白色或淡江色花。Bontius 氏 (1658) 謂：馬來氏治腦及神經疾患；花及葉治霍亂；假鱗莖治耳疾，以之加搗汁滴耳內。B.Douglas 及 A.K.Kiang 二氏 (1957) 于「植物化學之檢查第 1 部，生物檢」指出：莖舍生物檢。

L.F.Webb 氏 (1948) 于「澳洲昆士蘭之藥用及有毒植物指南」指出：根莖舍生物檢。(圖 10)

40. 木斛 (*Dendrobium flavidum* Hay.)

臺灣中北部山區。全年採全草，除去葉片，浸開水數分鐘后，晒乾，稱木斛。莖及葉爲鮮出葉、緊繫。

鈴木氏等 (1934) 研究：莖舍生物鹼 0.0067%。

41. 細葉石斛 (*Dendrobium hancockii* Rolfe)

四川、雲南。一名金釵花。全年將鮮石斛晒乾，或浸開水數分鐘后晒乾，稱小黃草、小黃草石斛。4~5 月剪去鬚根，于晒乾或烘乾時，同時用手揉搓，稱霍斗。爲石斛原料之一。(圖 11)

42. 金釵斛 (*Dendrobium hercoglossum* Reichb.f.) (圖 12)

廣東、廣西。一名鵝腺唇石斛。莖鮮用稱鮮石斛，加工后稱金釵斛、黃草、黃草石斛。爲國產石斛料之一。(圖 13)

43. 廣東石斛 (*Dendrobium kwangtungense* Tso)

廣東、廣西。一名白花銅皮石斛、銅皮蘭。莖鮮用稱鮮石斛。乾燥后稱廣銅皮石斛、黃草、黃草石斛。爲國產石斛原料之一。(圖 14)

44. 李氏石斛 (*Dendrobium linnianum* Reichb.f.)

廣東、臺灣、日本。一名金石斛。冬季開花白紫色。全年取莖鮮用稱鮮石斛，乾燥后稱金釵石斛。爲國產石斛之原料中之最佳者。鈴木氏等 (1934) 于「藥學」指出：莖舍生物鹼 0.47~0.18%，名石斛 (dendrobine)。(圖 15)

45. 粉花石斛 (*Dendrobium loddigesii* Rolfe)

雲南、兩廣、海南島。異名 D.pulchellum Lodd. 莖乾燥后稱小黃草、小黃草石斛。爲國產石斛料之一。

46. 白粉花石斛 (*Dendrobium loddigesii* var. *album* Tang et Wang)

華南。莖乾燥后稱小黃草、小黃草石斛。

47. 羅河石斛 (*Dendrobium lohohense* Tang et Wang)

廣西。莖乾燥后稱小黃草、小黃草石斛。

48. 長距石斛 (*Dendrobium longicalcaratum* Hay.)

臺灣。冬季開白花。鈴木、慶松、伊藤等 (1934) 于「藥學」指出：莖不含生物鹼。美國「化學摘要」指出：含生物鹼。

49. 馬克拉石斛 (*Dendrobium macraei* Lindl.)

印度。全草治腫、血及瘀疾。根及莖舍生物鹼名 jibantone 與兩種酸 A 及 B jabantic acid。(圖 16)

50. 石斛 (*Dendrobium moniliforme* (L.) Sw.)

中國、臺灣、韓國、日本。夏季開白花或淡紅色花。全草除去葉片稱鮮東斗，乾燥后稱石斛，爲國產貴重藥材。乃我國及日本產石斛原料之一。本草綱目 20 收載。石斛 (本經)，生津、健胃、強壯藥。用量 4~16 公克。Heury 氏 (1959) 于「生物檢」中指出：莖舍石斛鹼 (dendrobine)。(圖 17)

51. 金釵石斛 (*Dendrobium nobile* Lindl.)

雲南、四川、湖北。一名雲南石斛。冬季開白花 4~18 朵。全年取莖，除去葉片及鬚根，稱鮮石斛。

再烘乾，或泡開水后，撕去外皮，晒乾，稱金釵石斛。爲國產石斛之品質最佳者。滋陰益胃，生津止渴。主治熱病口乾舌燥。

莖舍生物鹼 0.05~0.3%，主成分爲石斛鹼 (dendrobine) 及其他 2 種生物鹼。(圖 18)

52. 鐵皮石斛 (*Dendrobium officinale* K.Kimura et Migo)

中國中南部。全草除葉片及鬚根，鮮用者稱鮮石斛，乾燥后稱鐵皮石斛、風斗、耳環石斛。幼枝加工曰楓斗。以湖北、安徽產之楓斗質量最佳，認爲係石斛中品質最良者。莖、葉含粘液質及澱粉。(圖 19)

53. 扁鱗莖石斛 (*Dendrobium Planibracte* Lindl.)

馬來、Burkhill 及 Haniff 二氏 (1930) 謂：研末擦頭及背部及膚病。

54. 有爪石斛 (*Dendrobium Plicatilis* Lindl.)

兩廣、海南。莖加工后稱石斛、有爪石斛。(圖 20)

55. 短石斛 (*Dendrobium Pumilum* Hook.f.)

緬甸、馬來、婆羅洲。Alvins 氏稱：治水腫，根煎服。

56. 紫石斛 (*Dendrobium Purpureum* Roxb.)

馬來亞。搗敷爲泥罨劑。

57. 鎮狀石斛 (*Dendrobium subulatum* Hook.f.)

馬來、Burkhill 及 Haniff 二氏稱：馬來人以葉研末，搽前額上以治頭痛。

58. 緣黃花石斛 (*Dendrobium tosense* Mak.)

中國、臺灣、日本、琉球。爲我國及日本產石斛原料之一。鈴木、慶松及伊藤三氏 (1934) 于「藥學」指出：莖舍生物鹼。(圖 21)

59. 王氏石斛 (*Dendrobium wangii* Tso)

兩廣。一名鷄爪蘭、小金釵。莖乾燥后稱小黃草、小黃草石斛。

60. 廣葉鈴蘭 (*Epiptaxis latifolia*)

台灣、臺灣。一名廣葉鈴蘭。治風濕病。

61. 黃城蘭 (*Eria corneri* Reichb.f.)

臺灣、蘭嶼。夏季開乳白色花。周鎮先生語者，山胞可供藥用云。

62. 海南鈴蘭 (*Eria pannae* Lindl.)

海南島、雲南、馬來、印度。異名 *Pinalia pannae* O.K.。Alvins 氏謂：治瘧疾，煎湯沐浴用。

Boosma 氏 (1902) 謂：爪哇生產 2 種含有皂素。

63. 星狀鈴蘭 (*Eria stellata* Lindl.)

G.Klein 氏 (1933) 于「植物分折手冊」指出：含生物鹼。

印度歐白及爲強壯劑。

64. 野芋蘭 (*Eulophia campestris* Wall.)

印度。先葉開花紫黃色。塊莖稱歐白及，(沙列布根 Salep)，視爲強壯劑及壯陽劑。

65. 棲芋蘭 (*Eulophia nuda* Lindl.)

喜馬拉雅、尼泊爾、印度。花玫瑰紫色至桃紅色或淡黃綠色。塊莖稱歐白及 (沙列布根, Silep)，爲驅蟲劑。

66. 緑芋蘭 (*Eulophia Virens* Spreng.)

印度。塊莖稱歐白及 (沙列布根, Solep)，視爲強壯劑及壯陽劑。Greeshof 氏 (1900) 謂：塊莖爲驅蟲劑。

67. 土通草蘭 (*Galeola septentrionalis* Reichb.f.)

日本。夏季開黃褐色。蒴果稱土通草，爲強壯、強筋藥。民間與甘草煎服，治淋病。全草燒灰，調髮油，搽看牙。

68. 提琴松蘭 (*Gastrophilus panduratum* Ridl.)

爪哇馬來。一名 Kaempferia pandurata Roxb. 根莖及根爲健胃藥，強壯藥、咳嗽藥。外用爲洗劑。

，治繡麻質斯及肌肉疼痛。根莖及嫩葉可充食物之香料。

### 赤箭、天麻治暈眩頭痛

69. 山赤箭 (*Gastrodia discolorrhiza* Hay.)

臺灣北部山區。花紅褐色。莖屬強壯劑。

70. 天麻 (*Gastrodia elata* Bl.)

中國、日本。(+)根莖：掘起根莖，除去莖及鱗根，去外皮，煮后，煥至九成乾，流黃蠟后，晾乾，稱天麻；明天麻；春天採者日春麻；明天麻；春天採者日冬麻，品質佳。本草綱目卷12收載。天麻（本經），乃量肢及頭痛之特效藥。用量4~16公克。根莖含香莢蘭醇 (vanillyl alcohol) 及粘液質。

(+)地上莖：晒乾稱赤箭、定風草。爲強壯劑。（圖23）

71. 白花天麻 (*Gastrodia elata* var. *pallens* Kitag.)

東北。根莖爲天麻原料之一。

72. 胡麻天麻 (*Gastrodis sessamoides*)

根莖煮熟供食，味美如番薯。

73. 檸檬色地寶蘭 (*Geodorum citrinum* Jack.)

馬來。假鱗莖含膠汁，可作膠糊之優良材料。

74. 垂花地寶蘭 (*Geodorum nudans* Ames)

臺灣、菲律賓、香港。異名Dendrobinum nutans Presl; Geodorum semicirratum Lindl. 夏季開粉紅白色花。假鱗莖含膠汁，爲膠糊之好材料。Guerrero氏(1922)謂：在菲律賓，以假鱗莖作藥膏原料用。

75. 紫地寶蘭 (*Geodorum purpureum* R.Br.)

馬來。假鱗莖爲膠糊原料。

76. 鳥嘴蓮 (*Goodiera morrisonicola* Hay.)

臺灣北部及中央山脈。一名Peramium morrisonicola Mak.。夏季開粉紅白花。一名鳥嘴蓮。全草充金線蓮之用。

77. 南投斑葉蘭 (*Goodyera nantoensis* Hay.)

臺灣。異名Peramium nantense Mak.。一名鳥蓮。全草充金線蓮之用。山胞以草煎服治熱病。

78. 手掌參 (*Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br.)

華北、東北、韓國、日本。(東北)掌狀根稱白及(本經)，偶稱手參、佛手參、毛茨姑、白芨、仙人掌。根莖未研，製成粘液，治中毒、萬下，泡灌服，爲強壯強精藥。大樹虎男(1937)研究：根莖含甘露聚糖(mannan)。（圖24）

79. 白鳳蘭 (*Habenaria miersiana* Champ.)

華南、臺灣、琉球、日本。夏季開純白花。根治腫毒。（圖25）

80. 山貓兒 (*Habenaria austinae* R.Br.)

華南。(廣東)搗敷潔歷。

81. 狹葉柱蘭 (*Hermannia angustifolium* Benth et Hook.f.)

中國、臺灣。一名Aceras angustifolium Lindl.; Platanthera angustifolia Reichb.f. 大根次另(1937)謂：根莖含甘露聚糖。

82. 丕葉南洋蘭 (*Hetaeria obliqua* Bl.)

馬來、印尼。Alvins氏謂：葉搗敷潰瘍。

83. 馬來騎士葉蘭 (*Hippophyllum scorlechinii* Schltr.)

馬來。Burkill及Haniff二氏(1930)謂：治耳痛，將莖及葉加熱、搗汁，滴入耳內。

84. 香龍舌蘭 (*Liatris odoratissima* Willd.)

美國。英名Deer's Tongue, Vanilla Leaf, Wild Vanilla,異名Trilisia odoratissima Cass.葉爲利尿、刺激、強壯藥，香烟香料。

85. 漢頭羊耳蒜 (*Lioarris kettaensis* Hay.)

臺灣。山胞以根治腹痛。

86. 亮拉羊耳蒜 (*Liparis krameri* Franch. et Savat.)

日本。江口、若杉二氏(2936)研究：葉、莖、根奇苦，含羊耳蒜鹼(Liparin)  $C_{22}H_{36}O_4N$ ，熔點 $124\sim 125^{\circ}\text{C}$ 。（圖26）

87. 黑花羊耳蒜 (*Liparis nervosa* Lindl.)

臺灣、日本。異名Ophrys nervosa Thunb.; Epidendrum nervosum Thunb.; Liparis formosana Reichb. f.。夏季開黑紫色花5~4朵。臺灣民間以莖爲解熱藥。

88. 小花羊耳蒜 (*Liparis parviflora* Lindl.)

C. Wehmer氏(1929)研究謂：含生物鹼。（圖27）

89. 楚氏羊耳蒜 (*Liparis tenuis* J.J.Smith)

印尼、馬來。Rumpf氏謂：在西里伯斯，以葉擦腹部治胃疾患。K.Heyne氏(1927)謂：治胃痛，取假鱗莖嚼服。

90. 短穗紋子陵 (*Luisia brachystachys* Bl.)

C. Wehmer氏(1929)研究謂：含生物鹼。

91. 鈍子股 (*Luisia teres* Bl.)

廣東、四川。本草綱目卷13收載。鈍子股(海藻)，一名金鎖股。根解毒驅疽藥(李時珍)。亦治熱痰、惡性瘡疾、眉桃腺炎(藏器)。（圖28）

92. 二色下鱗蘭 (*Marillaria bicolor*)

咀嚼可解渴。

93. 一點癀 (*Nervilia aragoana* Gaud)

臺灣、印度、印度。一名Pogonia nervilla Bl.。一年一葉蘭。夏秋採全草鮮用，或晒乾稱一點癀，一點紅。味酸苦甘，性寒。固肺涼血；消炎解鬱。主治肺疾、吐血，五勞七傷，高血壓。用量4~40公克。

94. 胡氏一點癀 (*Nervilia fordii* Schltr.)

中國。Hooper氏(1929)謂：葉等中藥，輸入馬來。

94. 染背一點癀 (*Nervilia purpurea* (Hay.) Schltr.)

臺灣中南部。異名Pogonia purpurea Hay.。全年採全草鮮用或晒乾，稱一點癀、一點紅、紅雞屁股、紅衣草。爲一點癀主要原料。效用與一點癀相同。

95. 兩棱莖環脊蘭 (*Oberonia anceps* Lindl.)

馬來。Alvins氏謂：在摩奴加，搗敷瘤。

歐白及腸炎緩和藥。

96. 廣葉紅蘭 (*Orchis latifolia* L.)

歐洲、英國。英名Salep, Salep Root。開紫花。塊根稱獸白及(沙列布)，爲包壩性緩和藥，外用作瀉腸料。效同竹芋。

97. 斑點紅蘭 (*Orchis maculata* L.)

歐洲、英國。花淡紫色～紫色。塊根為歐白及原料之一，效用同前種。

98. 歐白及 (*Orchis mascula* L.)

歐洲、英國。長穗狀花序，花紫色。塊根稱歐白及 (Salep Tuber, 沙布列)。為胃腸炎之緩和藥、瀉腸劑。含多量粘液質。

99. 沙列布紅蘭 (*Orchis militaris* L.)

日本。開紫花。大根虎男 (1937) 研究：根莖含采配蘭甘露聚糖 (Cremasta mannan) 20%，加水分解成甘露糖 (mannose)。效用與歐白及相同。

100. 美利阿紅蘭 (*Orchis morio* L.)

歐洲。開紫綠色花。球根稱歐白及 (Salep)，為腸炎之緩和藥。含大量之粘液質。今治不用。

101. 紫紅蘭 (*Orchis purpurea* Hudson)

歐洲。球根稱歐白及 (Salep)，為腸炎之緩和藥、瀉腸劑。含大量粘液質。

102. 爪哇兜唇蘭 (*Paphiopedilum javanicum* Fritz.)

爪哇原產，臺灣栽培。開花綠色花。C. Wehmer 氏 (1929) 稱：葉含生物鹼。Boorsma 氏 (1902) 謂：葉含生物鹼及皂素。根含皂素。

青石蛋治腎臟炎

103. 黃鶴蘭 (*Pnajus somai* Hay.)

臺灣。秋季開金黃色大花。全年採取假鱗莖鮮用，稱青石蛋、青石卵補腎水，主治腎臟炎。用量 4~40 公克。

104. 馬尼拉蝴蝶蘭 (*Phalaenopsis amabilis* (L.) Bl.)

原產菲律賓、印尼、馬來。本省引種栽培。冬季開白花。Greshoff 氏 (1900), L.F. Webb 氏 (1948) 于「澳洲昆士蘭之藥用植物及有毒植物指南」中稱：含生物鹼。

105. 矮梗蝴蝶蘭 (*Phalaenopsis Ineddemiana* Reichb.f.)

菲律賓原產，臺灣栽培。無定期開白花 3~8 朵。Greshoff 氏 (1900)，以及 L.F. Webb (1948) 于「澳洲昆士蘭之藥用植物及有毒植物指南」謂：氣生根含生物鹼。

106. 石仙桃 (*Pholidota chinensis* Lindl.)

廣東、香港。生草藥性備要。(嶺南) 治吐血，煎豬肉服；治風濕腫痛，浸酒服。

107. 佛羅勃蝴蝶蘭 (*Plantanthera rfflorenii* Fr. et Sav.)

日本。異名 *Plantanthera listeroides* Takeda。日本名水面蘭。秋季開淡綠色花。大根虎男 (1930) 研究：根莖含甘露聚糖。(圖 29)

108. 水曾干鳥粉蝶蘭 (*Plantanthera ophrydoides* Fr. schm.)

日本。一名 *P. amabilis* Koidz.; *P. reinii* Fr. et Sav.。8 月開淡綠花約 10 朵。大根虎男 (1930) 研究：根莖含甘露聚糖。(圖 30)

山慈姑清熱、解毒、消腫

109. 山慈姑蘭 (*Pleione bulbocodioides* (Franch.) Rolfe)

華南。4 月採球莖，除去莖、鱗葉及繫根，煮后晒乾稱山慈姑、毛慈姑、茅慈姑、茅茨姑。以四川產量大而品質佳。

本草綱目卷 13 收載。山慈姑 (宋嘉祐)，根氣味甘，微辛。消熱、解毒、消腫。用量 3~6 公克。

110. 乳頭蘭 (*Saccolabium papillosum* Lindl.)

喜馬拉雅、阿薩密、印度。一名 *Acampe papillosa* Lindl.。根為清涼劑，治懷孕質斯，亦為 *Sarsaparilla* 代用品。(圖 31)

111. 狸唇蘭 (*Sarcophilus* sp.)

南洋。Boorsma 氏 (1902)，C. Wehmer 氏 (1929) 謂：含有微量之生物鹼。

112. 蘭嶼紫蘭 (*Spadoglottis plicata* Bl.)

臺灣、馬來、薩馬亞。一名 *S. lilacina* Griff.。馬來名小仙茅。由春至夏開淡紫紅花。Burkill

圖(4)采配蘭

圖(3)蔓三七

圖(1)金線蓮

圖(2)白及



