

神

大飛揚草

曉 良

甘 健 松

查大飛揚草乃華南治瘧疾的常用藥，生藥學家稱治喘，歐美醫學家視爲呼吸器，哮喘病良藥，而本省稱本乳仔草，主治痢疾；然對於呼吸器的療法，知者寥寥，良藥不用，誰之過歟？今應醫苑主編數函，特簡介以鑒同好。

臺灣草藥一大本乳仔草

臺灣南北各地生草藥店出售一種止痢解熱治眼疾、腰骨痠痛的草藥，稱大本乳仔草。經筆者鑑定後，知爲大戟科之大飛揚草，學名爲*Euphorbia hirta* L.，該植物在全島各地原小有群落（羅純一助教攝），藥農多于1—5月，北部盛產期6—7月，採全草連根拔起，洗淨，晒乾，稱大本乳仔草或大本紅乳草，因其形酷似小飛揚草（臺灣名小本乳仔草或小本紅乳草，紅乳草，乳仔草），故名。年產量約200公斤。每公斤生產價格3元。生草藥師(1)嘉義白沙吳現謂：退大腸火，解熱。大本乳仔草40公分，水煎服。(2)張天澄稱：治眼科疾患，腰骨痠痛。大本紅乳草20—60公分，水煎服。(3)臺北鄭友欽謂：有殺大腸菌之功，主治痢疾。大本乳仔草，中甘壳仔草，鳳尾草，白花仔草各40公分。紅煎加紅糖，水煎服。痢中帶血甚多時，應加鮮仙鶴草40公分。

大本乳仔草之化學研究

許喬木博士會隨某業師上田英之助理學博士從事「大本乳仔草」之化學研究，將其結果發表于臺灣藥學誌第1卷第1期(1949)

A. 一般成分：新鮮全草含水分77.3% (110°C , 乾燥10小時)，對含無水物之一般分析：灰份(Ash) 9.93%，乙醚浸出物(大部係粗脂肪) 1.56%，氮化合物(Albumin etc.) 2.02%，粗纖維(Fiber) 11.50%，鞣質(Tannin, 皮粉法) 2.60%。

B. 主成分：係一種 Flavoneglucoside。名曰 Xanthorhamnin $C_3H_{42}O_{20}$ ，含量 0.2%，熔點 205°C，及鞣質。但不含槲皮素及生物鹼。茲將今年秋天即刻問世之臺灣藥用植物誌第三卷之大飛揚草，簡介如下：



(大飛揚草群落圖)

名稱：(學) *Euphorbia hirta* L.; (異)

，臍乾，稱大本紅乳仔草。每公斤6元。治眼疾，腰酸背痛，痢疾。生草藥店多用鮮品。

效用：(嶺南) 名始見生草藥性譜要。大飛揚草味，性寒小飛揚同，全草治浮游海火，牙齒腫痛，搗爛敷於頰旁，煎水洗疥癩。²⁶

全草煎服，治痢疾及婦人乳旁發生腫毒。又切細幹炒後，稱摩茶，煎服治瘧疾(潮州藥用植物志)。為治氣管炎及喘息之藥，通常製成浸膏，流浸膏，配等而用之。本品美國國家處方書收載之。⁴

成分：Power及Brown二氏(1913)取乾草用各種溶液抽出，計石油醚抽出物1.85%，乙醚抽出物1.60%，CH₃OH抽出物0.80%，醋酸ethyl抽出物4.09%，酒精抽出物6.50%。

由酒精抽出物中，知全草含微量生物鹼，沒食子酸C₆H₅O₃，精油(Quercetin)，酚性物質C₁₈H₁₈O₁₅，糖α-Phenylquerkozazene Tri-acetan C₃₀H₅₀O₃，Cerylalchol C₃₇H₆₆O痕跡Eu-phosterol C₂₅H₄₈O₃，Phytesterin，Physoterrin，Jambule C₁₆H₃₀O₄ (OH)₅，香蜂葉酸(Meissinic acid) C₃₀H₆₀O₂，棕櫚酸，油酸，次亞麻油酸等。⁶⁶鞣質，樹脂，1-Inositol等。¹²³

藥理：微有刺激及麻醉性。⁸⁷小動物雖服小劑量亦可中毒死。⁸⁶

全草有毒，動物之中毒量：體重一公斤之乾品1公分。因使動物心肺受害而致死。吸烟用時為一種抑制心肺機能，而產生對支氣管的鎮壓作用，使之擴張弛緩。

Osborn氏(1943)謂：水浸液在試管中，對金黃葡萄球菌，及大腸桿菌無抗生素作用。⁹⁴

藥材：(臺灣) 2—5月將全草連根拔起，洗淨

(巴西) 治淋病，恐由其具利尿作用之故耳，亦治哮喘。⁸⁷

(越南) 全草治赤痢，下血。⁵²

(歐洲) 治哮喘，但在醫藥上並無地位。⁸⁷

(美國) 煎劑治哮喘及支氣管炎，普通與Squill Senega之混合浸膏。⁹⁰美國藥局方用全草二公分(一日量)煎服。為驅痰，祛痰藥。美國的好些止咳藥水均用之。

(英國) 全草為抗哮喘性和胸藥，在澳洲，視為咳嗽、氣管支炎及肺部疾患良藥；尤其對陣發性哮喘有立竿見影之效，其浸劑14公分量於0.568公升沸水中而製成。

製劑：酊劑(1:5)：劑量0.6-1.8cc；Ext. Euphorb. Liq. B. P. C. 劑量：0.12-0.3cc；Ext. Euphorb.；劑量0.6-0.12g；Syr. Cocillan, co B. P. C. 1949；劑量1.8-3.6cc⁹⁵

形態：莖高20—60cm，全草淡紅色或紫色，有毛，折之有白汁。葉對生，長橢圓狀披針形，鋸齒緣，長2—4.5cm，寬8—15mm，基部歪楔形至圓形，主脈3—4條，表面腺生短毛，叶背帶黃色，有毛，具短柄。夏秋之間腋生黃褐色小花，頭狀聚繖花序，被黃色毛，紅熱。種子長0.7—0.8mm，卵形，具三棱，表面有橫皺。(圖637 Kirtikar-Basu二氏)

成分：Power及Brown二氏(1913)取乾草用各種溶液抽出，計石油醚抽出物1.85%，乙醚抽出物1.60%，CH₃OH抽出物0.80%，醋酸ethyl抽出物4.09%，酒精抽出物6.50%。

由酒精抽出物中，知全草含微量生物鹼，沒食子酸C₆H₅O₃，精油(Quercetin)，酚性物質C₁₈H₁₈O₁₅，糖α-Phenylquerkozazene Tri-acetan C₃₀H₅₀O₃，Cerylalchol C₃₇H₆₆O痕跡Eu-phosterol C₂₅H₄₈O₃，Phytesterin，Physoterrin，Jambule C₁₆H₃₀O₄ (OH)₅，香蜂葉酸(Meissinic acid) C₃₀H₆₀O₂，棕櫚酸，油酸，次亞麻油酸等。⁶⁶鞣質，樹脂，1-Inositol等。¹²³

藥理：微有刺激及麻醉性。⁸⁷小動物雖服小劑量亦可中毒死。⁸⁶

全草有毒，動物之中毒量：體重一公斤之乾品1公分。因使動物心肺受害而致死。吸烟用時為一種抑制心肺機能，而產生對支氣管的鎮壓作用，使


(馬來) 用途甚廣，乳液滴入眼內治結膜炎及角膜炎(Ridley, 1906)並治其他眼科疾患(Burkill et Haniff 1930)，此液汁作混合液於小兒出生後最初三日用之。

作泥罨劑治脹瘡及挫傷，以及為海蟲Chelia所傷之用，菲律賓人亦用之。

馬來半島上中國人之生草藥店亦用之。

在荷屬東印度用浸膏治慢性卡他及其他胸部疾患。此液汁滴入眼內治眼病，並外塗皮膚等。

在爪哇及馬來西亞為小兒良藥。



大飛揚草圖片

高級傢俱
修裝設計
傢俱設計
璜裝內室

住址：臺北市昆明街九十八號之三
電話：34495號