



針灸在拔牙上的應用

主講：姚振華教授
蘇平祥整理



足陽明胃經穴圖

△ Acupuncture analgesia can be of particular value in the following condition:

1. Allergic to anesthetics
2. Blood disease, diabetes, hyperthyroidism, abnormality of cardiovascular system, etc.
3. Psychological repulsion against anesthetics as a result of past unpleasant experience.
4. Pregnant woman, — The needle treatment can also be applied to a pregnant woman with the exception of the following forbidden bodypoints.

- ① 合谷
- ② 三陰交 San Yin - chiau
- ③ 關元 Kwan - Yuan
- ④ Chi - Hai

*因為以上四處施針會導致流產，abortion，在優生保健法尚未立法以前，不主張利用這些穴位來人工流產。

△ Effectiveness of acupuncture treatment on trigeminal neuralgia. The criteria of scoring are as follows.

1. Excellent means no pain and no discomfortable feeling.
2. Good means no pain but has a slight uncomfortable feeling.
3. Fine pain but it is still tolerable.
4. Poor 有痛且不能忍受，必須另以麻醉劑來幫忙。
5. Failure 完全 reject , 不能接受。

△ 應用於牙科之治療之經穴表：

經名	穴名	主	治	穴屬	配穴
1. 肺經	列缺	口噤不開 trism-	井穴	絡穴	
		us			
		口歪眼斜 facial			
		paralysis			
2. 大腸經	商陽	下齒痛	井穴		
	合谷	齒 痛	原穴	地倉	
		口歪眼斜		列缺	
		牙關緊閉		頰車	
手三	口歪眼斜				
	里				
	肩頸	齒 痛	小腸		
		大腸			
		陽經			
		之會穴			
	迎香	口歪眼斜	大腸		
		胃經			
		之會穴			
		迎香			
		—應朝鼻翼由外向內			
		斜進針			
3. 胃經	承泣	口不能言	腸胃經脈之		
			會穴		
		地倉	三叉神經	大腸胃經脈	頰車
		痛			
		之會穴			

口歪眼斜	陽經之會穴	合谷
牙關不開		
齒痛頰腫		
頰車	口歪眼斜	合谷
	牙關不開	地倉
	牙關脫臼	
	後下牙麻	
	醉	
下關	下牙齒痛	
	TMJ dislocation	
足三	口歪眼斜	
里		
內庭	齒 痛	
	厲兌	牙齦腫
• 進針方法：	地倉進針——向後外側斜進針	
	下關進針——在 coronoid process 與 condylar process 之間垂直進針，瘦者半寸，胖者一寸，1/2~1 小時。	
	厲兌進針——在脚 2，3 趾之間進針，很痛。	
4. 脾經	商丘 (sp5)	舌強 (stiffness of tongue)
5. 心經	少海 (HB)	齒痛
	通里 (HB5)	暴瘡 (失眠)
		絡穴
	神門 (HB7)	失音 (Aphasia)
		俞穴
6. 小腸	少澤 (HI)	舌強
		井穴
	經	
	腕骨	頰腫 (mumps)
		原穴
	額髎	
	口歪眼斜	小腸
		三焦

		之會穴	14. 任脈	天突	暴瘡		7. 舌強	商丘	少澤	心俞
				承漿	口歪眼斜				金津玉液	
		上齒痛			牙痛		8. 失音	通里	神門	瘡門
7. 膀胱	心俞	一切舌痛		15. 奇穴	印堂	三叉神經痛			關沖	
經				16. 秘穴	魚腰	口歪眼斜		9. 三叉	瞳子髎	印堂
8. 腎經	太谿	口糜	俞穴		頰裏	口歪眼斜	下關	神經痛	地倉	蝶頸
		齒痛				口瘡 (abscess)		10. 口歪眼	頰車	下關
9. 心包	勞宮	口糜				齒齦瘻瘍	顴髎	斜	列缺	合谷
經									手三里	
10. 三焦	液門	齒痛		金津	重舌舌強				足三里	迎香
經		齒齦炎		玉液					地倉	
	翳風	頰腫	三焦		八邪	牙痛			翳風	絲竹空
			膽經						聽會	
			之會穴		△牙科針灸治療參考表：				瞳子髎	太沖
					病名	鍼	刺	穴	人中	
					1. 齒痛	(+)	合谷	(下牙痛，拔牙)		承漿
										魚腰
		牙關緊閉								
		口歪眼斜								
		絲竹空								
		口歪眼斜								
		空								
11. 膽經	瞳子	三叉神經痛								
	瞓	Facial palsy								
12. 肝經	太沖	無痛分娩常用								
		口歪眼斜								
13. 腎臟	京門	舌緩不能言	腎臟							
經		陽經								
		之會穴								
		百會	口張不開							
			(急救穴)							
		人中	口歪眼斜							
		兌端	牙關不開							
			口瘡口臭							
		• 百會為 6~12 條經脈交會之處，屬於急救穴，若此穴受外傷，則會致死。		3. 牙關	列缺	合谷	地倉			
		• 人中亦為急救穴，當暈倒，溺水時，用指甲插刺人中，則醒。			緊閉	兌端				
				4. 脫臼	頰車	下關				
				5. 口腔	太谿	勞宮	頰裏			
					瀆瘍	金津玉液	兌端			
				6. 頰腫	商陽	地倉	腕骨			
						翳風	聽會			

- 一般針灸拔牙時常使用 3~4 針。
 - 針灸拔牙時應持續運針，才能達到理想之麻醉效果，因此需要一個助手幫忙做持續性運針（每隔 1 分鐘運一次）或裝上一個電刺激器 stimulator 亦可（刺激頻率為每分鐘 180 次左右）
 - 針灸拔牙成功率之比較表如下：
- | | 治療標準：優好 | 表示拔牙成功 | 尚可劣 | 表示拔牙失敗 | |
|----|---------|--------|-----|--------|---------|
| | 優 | 好 | 尚可 | 劣 | 成功率 |
| 男 | 377 人 | 246 | 43 | 6 | 82 76.7 |
| 女 | 54 人 | 32 | 2 | 3 | 17 63.0 |
| 總數 | 431 人 | 278 | 45 | 9 | 99 74.9 |
- 針灸拔牙麻醉之誘導時間：
- 所謂誘導時間乃是針刺以後，至以銳器刺激牙齦而無痛覺所需之時間，此時中醫稱之為得氣，西醫稱之為針感，往往在此時有臉色蒼白、出汗之現象。
- | 誘導時間 (分鐘) | 人 數 |
|-----------|-----|
| 1 ~ 4 | 1 |
| 5 ~ 9 | 256 |
| 10 ~ 14 | 129 |
| 15 ~ 19 | 33 |
| 20 ~ 24 | 12 |
| | 431 |
- 若誘導時間超過 10~15 分鐘，患者仍無針感（以銳器刺激牙齦仍感疼痛），才放棄行針灸麻醉，但往往運針時間一久，針感愈重，表示麻醉作用增強。
- 針灸麻醉在去針後 2~4 小時仍然存在麻醉作用，且嘔吐或不適感較一般使用麻醉劑要顯得輕微得多，此亦可說是針灸麻醉之優點。