



健康新聞

資料來源／衛生署

想紋眉、紋身的愛美人士注意了！紋眉、紋身若未注意清潔消毒，不只會感染血液傳染疾病，還可能感染會引發皮下丘疹、膿疱、淋巴發炎的「嗜血分枝桿菌」，病情嚴重者須住院治療。

衛生署疾病管制局提醒民眾，如有血液相關或糖尿病等慢性疾病，應盡量避免紋眉或紋身等侵入性美容行為。

疾管局表示，嗜血分枝桿菌常見於皮膚感染、主要感染免疫功能低下者，包括美國、瑞士和我國都有案例傳出。去年台灣也有民眾因進行美容手術造成腿部潰爛，並引起醫療糾紛，後來被判定感染非結核分枝桿菌。

疾管局引用Emerging Infectious Diseases (EID) 近期期刊指出，美國西雅圖1名44歲健康男性於2009年8月進行左前臂紋身，3天後於紋身處出現無痛性紅疹，自行塗抹消炎藥膏無效；12天後開始出現皮下結塊，兩週後症狀仍未緩解，經多次就醫證實感染嗜血分枝桿菌。同年10月，相同紋身地點又出現1

名疑似感染嗜血分枝桿菌的病例，目前尚無法確認感染來源。

Clinical Infectious Diseases (CID) 近期期刊亦有類似報導，瑞士有12名無特殊疾病、平均56歲的女性，於2009年4月至12月間，至同一地點進行紋眉後陸續感染嗜血分枝桿菌。12人眼眉位置均有傷口，並出現頸部淋巴發炎，其中10人須接受手術治療。經調查發現，此12名感染者共用的紋眉染料含有嗜血分枝桿菌。

疾管局表示，嗜血分枝桿菌為非結核分枝桿菌，主要存在水中，適宜生長於攝氏30度的環境。感染者會出現皮下結塊或丘疹、膿疱等症狀，少部分感染者會併發敗血性關節炎、骨髓炎、肺炎與全身性發炎等嚴重症狀。

紋眉與紋身一樣，刺針穿入皮膚深層，一旦工具或染料遭細菌污染，除了會讓刺針造成的傷口發炎留下疤痕，嚴重時，細菌更可隨血管或淋巴流動引發全身性發炎。疾管局呼籲民眾，愛美之餘仍應以自身健康為重。🌐