



子宮頸癌疫苗 也可預防菜花

◎潭子社區醫療群/潭興診所 林重賢醫師

子宮頸癌佔臺灣婦女癌症發生率的第一位。民眾若能提早預防或早期發現及早期治療子宮頸癌，將可大大減少子宮頸癌的發生率及死亡人數。

如何早期發現子宮頸癌

子宮頸細胞在變成癌症之前，會產生異常變化稱細胞病變，病變程度由輕度，到中度，再轉變成重度（即子宮頸原位癌），需時達五到十年之久。因此，只要定期做子宮頸抹片，就可以儘量早期偵測到子宮頸病變。但是有三至四成的子宮頸病變無法由抹片偵測到！

我們發現子宮頸癌細胞中幾乎90%含有人類乳突病毒（HPV型16, 18, 31, 33, 52, 58）。也因此，在提升子宮頸抹片的準確度上，進行子宮頸抹片的同時也進行HPV病毒檢測變得有意義了。但是，健保不給付HPV檢測，民眾必須自費！

為什麼抗HPV病毒疫苗可以變成子宮頸癌疫苗亦可預防菜花！

目前，我們無法很確定的說子宮頸癌是由HPV引起的，但是，兩者關係十分密切。所以，預防HPV的感染就有機會預防70%的子宮頸癌。因為HPV6和11與生殖器疣（俗稱菜花）有關，因此防治HPV、6、11和16、18型的疫苗，還可降低感染菜花的風險。

以HPV疫苗預防子宮頸癌的費用

默克藥廠出品的佳喜（Gardasil）疫苗在美國售價一劑約新台幣NT：4000，總共需打三劑，分別在第0, 2, 6個月注射，總計新台幣NT12,000。目前建議9至26歲，健康狀態良好、尚未計畫懷孕之女性可接受疫苗注射。國內女性初次發生性生活的年齡越來越低，這代表罹患子宮頸癌的風險也越來越早。如果疫苗發揮效果，我們就可以減少70%的子宮頸癌及90%的菜花。男性也可用來預防菜花及某些陰莖癌，但有人擔心動長性疝氣，因此默克藥廠未在男性用途方面特別說明。

醫師簡介

林重賢 醫師

潭子社區醫療群/潭興診所