

常見的兒童發疹病一 猩紅熱

◎陳子社區醫療群/何孟哲小兒科診所 何孟哲醫師、林育瑩醫師

念幼稚園大班的小智，今天一大早，就因為高燒三十九度，由父母帶來到門診就醫。何醫師說道：昨櫻過好好的，今早就要樣了，也沒有什麼症狀只是一直咳嗽聲、肚子痛而已。經由物理檢查，發現他的咽喉部紅腫，舌苔黃乳頭很明顯，臉頰潮紅，身體腳背腹膜有如砂紙般的粗糙感。病史追蹤發現，小智班上同學，有人有類似病況；綜合上述，小智確診為猩紅熱（scarlet fever）患者，經給予抗生素藥物，退燒治療10天後痊癒。

一、病因

猩紅熱（scarlet fever）是因受到A型鏈球菌的感染所致，好發5至15歲的兒童，在冬末春初之際最常見。

二、主要傳染途徑：主要經由飛沫傳染。

三、症狀表現

潛伏期一天至七天，平均三天；之後病人會出現發燒、喉嚨痛、無苔舌、頭痛、腹痛及呕吐等症狀。發病12至48小時後身上會有皮疹出現。皮疹時有如砂紙般，外觀有如輪狀或瘀樣之皮膚，如受壓則變蒼白。通常頭部、腋下、鼠蹊部的皮疹最多且最早發生，發疹24小時之後會遍及全身，尤其是臉頰病竈尤具明顯，另可見咽部鼠蹊部發紅，喉嚨附近充血，有「出血點」散佈在軟顎及腮腺上。發病前兩天，舌頭表面成灰白色，舌頭味蕾明顯，稱作「白色」草莓樣舌頭。第四、第五天後，舌頭

會脫皮，留下「紅色」草莓樣舌頭，另在身體腋垢處，有色素沈淀者充血的模樣，予以壓迫，模樣之顏色仍然不會消失。

發病幾天後，皮疹逐漸消褪，一至兩星期後出現「脫皮」現象。尤其是在四肢指端、腋下及鼠蹊部脫皮最明顯。通常皮疹愈嚴重的人，脫皮也愈厲害。

四、預防方式

猩紅熱的為飛沫傳染性疾病，故與接觸病童的人均應戴口罩；一般經過適當治療24小時之後，即不具有傳染力，因此病童至少需接受治療後的24小時隔離。

五、治療方法

治療方式主要是給予盤尼西林類的抗生素藥物，連續治療10天。

六、預後及合併症

大部分的猩紅熱治療後都可痊癒，少部分則可能發生下列併發症：

(一) 急性化膿性併發症：如中耳炎、鼻竇炎、馬拉瑟球菌膿瘍、後眼部纏織及肺炎等。

(二) 非化膿性併發症：如急性腎絲球腎炎及急性風濕熱。

(三) 由鏈球菌之毒素引起之毒性休克症候群。



何孟哲醫師・林育瑩醫師

陳子社區醫療群/何孟哲小兒科診所

