



校園新聞

捐血暨傳染病防治宣導活動

◎ 衛生保健組 何文照/許銘津 2012-03-26

[讚](#) [寄送](#)

衛生保健組於3月26日上午9至下午4點於互助大樓1樓舉辦捐血暨傳染病防治宣導活動期捐血注意事項如下

捐血者健康標準

中華民國95年3月15日衛署醫字第0950207650號令發布

第一條 本標準依血液製劑條例第十四條第二項規定訂定之。

第二條 捐血者須符合下列條件，始得捐血：

一、年齡：

- (一)十七歲以上，六十五歲以下，一般健康情況良好。
- (二)未滿十七歲者，應視體能狀況，並經法定代理人之同意，始得捐血。
- (三)逾六十五歲者，除應健康情況良好外，並應取得醫師之同意，始得捐血。

二、體重：

- (一)女性應四十五公斤以上，男性應五十公斤以上。
- (二)捐分離術血小板、分離術白血球及分離術血漿者，應五十公斤以上。

三、體溫：口溫不超過攝氏三七·五度。

四、血壓：收縮壓九〇～一六〇毫米汞柱，舒張壓五〇～九五毫米汞柱，如兩者之距離低於三〇或高於九〇毫米汞柱，須經醫師許可。

五、血液檢查：

- (一)血紅素：男性十三公克%以上（使用硫酸銅法時血液比重一·〇五四）。女性十二公克%以上（使用硫酸銅法時血液比重一·〇五二）。
- (二)血小板：捐血小板者，其血小板數目應在 $15 \times 10^9 / \text{mm}^3$ 以上。
- (三)白血球：捐白血球者，其絕對顆粒球數目應在 $3,000 / \text{mm}^3$ 以上。
- (四)血漿總蛋白：捐血漿者，應於首次捐血暨每隔半年加驗血漿總蛋白量，其血漿總蛋白應在 6g/dl 以上。

第三條 捐血者每次之捐血量及捐血間隔如下：

- 一、每次捐血以二五〇毫升為原則，但體重六〇公斤以上者，每次捐血得為五〇〇毫升。
- 二、每次捐血二五〇毫升者，其捐血間隔應為二個月以上；每次捐血五〇〇毫升者，其捐血間隔應為三個月以上。但男性年捐血量應在一、五〇〇毫升以內；女性年捐血量應在一、〇〇〇毫升以內。
- 三、捐分離術血小板、分離術白血球或分離術血漿者，每次之間隔為二星期以上。
- 四、捐分離術血漿量每次以五〇〇毫升為限，其全年捐血漿量不得超過十二公升。

第四條 捐血者有下列情形之一者，應暫緩捐血：

- 一、婦女懷孕中或產後（含流產後）六個月以內者。
- 二、大手術未滿一年或一年內曾接受輸血者。
- 三、四星期內曾接種麻疹、德國麻疹、腮腺炎及小兒麻痺（口服）等活性減毒疫苗者。
- 四、六個月內曾罹患肝炎或密切接觸肝炎病患者。
- 五、現患梅毒、活動性結核病、糖尿病、心臟病、消化道潰瘍出血、高血壓、腎臟病、哮喘、感冒、急性感染、傳染病、過敏病症者。
- 六、自瘡疾疫區回國一年內或曾在三年內罹患瘧疾者。
- 七、曾在七十二小時內拔牙者。
- 八、曾在五天內服用含Aspirin類藥物或其他可抑制血小板功能之藥物者，不得捐血小板。
- 九、B型肝炎表面抗原檢查呈陽性反應者。
- 十、C型肝炎病毒抗體檢查呈陽性反應者。

- 十一、民國六十九年至八十五年間曾在英國輸血或曾至英國旅遊或居留時間合計超過三個月者，或民國六十九年以後曾於歐洲旅遊或居留時間合計超過五年者。
- 十二、經通報為嚴重急性性呼吸道症候群疑似或可能病例，於治療痊癒後，未逾三個月內者。
- 十三、曾與嚴重急性性呼吸道症候群疑似或可能病例密切接觸，於最後接觸日起一個月內者。
- 十四、自有地區性傳播嚴重急性性呼吸道症候群之地區回國後一個月內者。
- 十五、自西尼羅病毒流行區離境日起一個月內者。
- 十六、懷疑自己感染愛滋病毒或二年內曾與可能感染愛滋病毒者發生性行為者。
- 十七、一年內曾從事危險性行為或曾罹患性病(梅毒、淋病、披衣菌、生殖器皰疹、軟性下疳、尖型濕疣等)者。
- 十八、一年內曾刺青者。

第五條 捐血者有下列情形之一者，永不得捐血：

- 一、曾患惡性腫瘤、白血病或其他經醫師認為永久不得捐血者。
- 二、曾有出血不止、抽癢或昏迷之病史者。
- 三、曾有吸毒或慢性酒精中毒者。
- 四、靜脈注射藥物成癮者、男性間性行為者及長期使用血液製劑者。
- 五、曾為AIDS患者。
- 六、愛滋病毒第一型及第二型（HIV-I / HIV-II）抗體檢查經確認呈陽性反應者。
- 七、人類嗜T 淋巴球病毒第一型（HTLV-I）抗體檢查經確認呈陽性反應者。
- 八、曾罹患庫賈氏病者（CJD）、曾注射人類腦下垂體生長荷爾蒙者、曾注射人類腦下垂體親生腺腺素（humanpituitary gonadotropins）者、曾注射牛胰島素等生物製劑者、曾接受硬腦膜移植者或家族中有庫賈氏病（CJD）患者。
- 九、曾從事性工作者。

第六條 捐血機構對捐血者實施健康篩檢之項目如附表。

第七條 本標準自發布日施行。

附表：捐血者健康篩檢項目

- 一、體重：女性應45公斤以上，男性應50公斤以上。
 - 二、體溫：口溫不超過攝氏37.5度。
 - 三、血壓：收縮壓90~160毫米汞柱，舒張壓50~95毫米汞柱，如兩者之距離低於30或高於90毫米汞柱，須經醫師許可。
 - 四、血液檢查
 - （一）血紅素：男性13公克%以上（使用硫酸銅法時血液比重1.054）。女性12公克%以上（使用硫酸銅法時血液比重1.052）。
 - （二）血小板：捐血小板者，其血小板數目應在 $15 \times 10^9 / \text{mm}^3$ 以上。
 - （三）白血球：捐白血球者，其絕對顆粒球數目應在 $3,000 / \text{mm}^3$ 以上。
 - （四）血漿總蛋白：捐血漿者，應於首次捐血暨每隔半年加驗血漿總蛋白量，其血漿總蛋白應在 6g/dl 以上。
 - 五、ABO血型檢驗。
 - 六、Rh血型檢驗。
 - 七、紅血球異體抗體篩檢。
 - 八、血清轉胺酶檢驗（ALT）。
 - 九、梅毒血清檢驗（STS）。
 - 十、B型肝炎病毒表面抗原檢驗（HBsAg）。
 - 十一、人類免疫缺乏病毒第一型、第二型抗體檢驗（Anti-HIV-1/2）。
 - 十二、C型肝炎病毒抗體檢驗（Anti-HCV）。
 - 十三、人類嗜T 淋巴球病毒抗體檢驗（Anti-HTLV-I/II）。
- 為預防校園傳染病積極宣導對於新流感、禽流感、腸病毒、愛滋病、肝炎、肺結核防治認知宣導。

【相關圖片】



由台中市捐血中心與衛保組合辦



同學踴躍參與捐血及傳染病
宣導活動



衛保組何文照組長親自指導
傳染病防治宣導及以身作則
率先參與捐血

資料來源：http://www.cmu.edu.tw/news_detail.php?id=1959.pdf

中國醫藥大學 China Medical University, Taiwan

地址：40402 台中市北區學士路91號 電話：04-22053366（分機一覽表）

Address: No.91 Hsueh-Shih Road, Taichung, Taiwan 40402, R.O.C

電子郵件：cc@mail.cmu.edu.tw 校安中心：04-22022205、05-7832020（北港）

性騷擾性侵害學生申訴專線：04-22022205 申訴窗口：學務處生輔組

中區區域教學資源 | 智慧財產權 | 教育部獎補助